

## 補遺3

日本歯科医学会プロジェクト研究

「口腔疾患に対する禁煙の効果」多施設共同研究

平成28年6月14日

### 研究計画書

改定	現行
8. 禁煙介入基準：	8. 禁煙介入基準：
<p>追記            ファーガストロームのニコチン依存度テスト (FTND) のスクリーニングでニコチン依存度が7点以上で、禁煙意志が強く、ただちに禁煙をしたいと思っている者を禁煙介入の対象とする。ニコチン依存度 (FTND) が6点以下で禁煙意志が弱いか意志のない者は非禁煙介入とする。FTNDが7点以上でもすぐに喫煙しようと考えていないか禁煙意志のない喫煙者は、非禁煙介入群として研究に参加する (資料1研究フローチャート参照)。途中で禁煙意志が強くなった場合はその時点で禁煙介入を行う。FTNDが6点以下で、禁煙意志が強い喫煙者に対する禁煙治療は、研究対象外のため以下のニコチンパッチの無償提供はない (9. 禁煙介入・評価方法参照)。禁煙介入群の患者で喫煙を再開したが再度禁煙治療を希望した場合は、再度禁煙支援・治療を行っていく。</p>	<p>ファーガストロームのニコチン依存度テスト (FTND) のスクリーニングでニコチン依存度が7点以上で、禁煙意志が強く、ただちに禁煙をしたいと思っている者を禁煙介入の対象とする。ニコチン依存度が6点以下で禁煙意志が弱いか意志のない者、またすでに禁煙治療を受けている者は非禁煙介入とする。</p>
9. 禁煙介入・評価方法：	9. 禁煙介入・評価方法：
<p>追記            (短時間の禁煙アドバイス、p54~60、禁煙支援マニュアル第二版、厚生労働省)。</p>	なし