

補遺 7

日本歯科医学会プロジェクト研究
「口腔疾患に対する禁煙の効果」多施設共同研究

平成 29 年 4 月 18 日

研究計画書

改定	現行
9. 禁煙介入・評価方法：	9. 禁煙介入・評価方法：
OTC薬（ニコチン代替剤）の使用を必要とする場合は、ニコチンパッチ（最大8週間分）を無償で配布する。	OTC薬（ニコチン代替剤）の使用を必要とする場合は、ニコチンパッチ初回投与分（2週間）は無償で配布し、その後は被験者自身が購入する。
20. 研究資金：	20. 研究資金：
日本歯科医学会「平成 27 年度プロジェクト研究費」 参加学会からの研究参加費 平成29年度科学研究費補助金（基盤研究C）	日本歯科医学会「平成 27 年度プロジェクト研究費」 参加学会からの研究参加費 厚労科研費（予定）

研究同意説明書

改定	現行
<u>禁煙治療にかかる費用</u>	<u>禁煙治療にかかる費用</u>
<u>今回の研究では禁煙治療に使用する禁煙補助剤を無料で配布します。</u>	<u>今回の研究では初回の2週間分の禁煙補助剤を無料で配布します。</u>
臨床研究の情報開示	臨床研究の情報開示
方法：担当する歯科医師、歯科衛生士が口腔治療と平行して、禁煙希望のある患者に時間をかけて禁煙アドバイスをする。禁煙補助剤の併用が望まれる場合は、 <u>ニコチンパッチを無償で配布する。</u>	方法：担当する歯科医師、歯科衛生士が口腔治療と平行して、禁煙希望のある患者に時間をかけて禁煙アドバイスをする。禁煙補助剤の併用が望まれる場合は、 <u>初回の2週間分のニコチンパッチを無償で配布する。</u>